



## L'excursion du samedi 23 mai 2015 : balade malacologique dans la région de Gesves

Claude VILVENS - Photos: Christiane DELONGUEVILLE, Nicole SCAILLET et Claude VILVENS

La commune de Gesves se trouve approximativement au centre d'un triangle formé par Huy, Namur et Ciney. La région est verdoyante, propice aux balades en tous genres et, pourtant, nous n'avons jusqu'à présent effectué aucune prospection malacologique dans cette région.

Nous avons donc réparé cet oubli en nous basant sur les nombreuses balades proposées par la commune.

D'une part, nous nous sommes inspirés de la Balade de Surhuy, aux alentours du Verger conservatoire. Après nous être éloignés d'à peine 10 m des voitures parkées rue des Moulins que les premiers *Fruticicola fruticum* venaient nous dire bonjour ! L'espace ouvert parcouru puis le bois qui nous ramenait au point de départ devaient se révéler bien intéressants : - jugez-en plutôt dans le tableau ci-dessous.



Nous nous sommes ensuite mis en route pour un accès au Samson en nous basant cette fois sur la Balade des Forges et plus précisément la carrière d'Inzéfonds. Nos recherches furent moins fructueuses, mais nous permirent cependant de constater la présence de quelques mollusques d'eau douce comme les ubiquistes *Potamopyrgus* et *Ancylus*.

Pour terminer, nous avons poussé le souci du détail de notre étude en nous intéressant à un restaurant dénommé le "Petite Gesves" qui ne nous a pas déçu et n'est pas "petit" du tout : en fait, ce fut un "petit banquet" avant l'heure ☺ !

**Listes des espèces de mollusques terrestres et dulcicoles observées le 23/5/2015 dans la région de Gesves**  
(déterminations : Johann Delcourt, Roni Maes, Etienne Meuleman & Claude Vilvens)

1) Premier site "rue des moulins" :

Nom latin	Nom vernaculaire
<i>Arion distinctus</i> Mabilie, 1868	Limace noire
<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon 1855	Arion vulgaire [limace]
<i>Cepaea hortensis</i> (Müller, 1774)	Escargot des jardins
<i>Cepaea nemoralis</i> (Linnaeus, 1758)	Escargot des haies ou des bois
<i>Clausilia bidentata</i> (Ström, 1765)	Clausilie noirâtre
<i>Cochlicopa lubrica</i> (Müller, 1774)	Bulime brillant
<i>Deroceras invadens</i> (anc. <i>D. panorminum</i> ) (Lessona & Pollonera, 1882)	Loche maltaise
<i>Deroceras reticulatum</i> (Müller, 1774)	Limace réticulée
<i>Discus rotundatus</i> (Müller, 1774)	Hélice bouton
<i>Fruticicola fruticum</i> (Müller, 1774)	Hélice des buissons
<i>Helix pomatia</i> Linnaeus, 1758	Escargot de Bourgogne
<i>Limax maximus</i> Linnaeus, 1758	Limace léopard
<i>Macrogastra rolpheii</i> (Turton, 1831)	Clausilie de Rolph
<i>Merdigera obscura</i> (Müller, 1774)	Bulime obscur
<i>Monachoides incarnatus</i> (Müller, 1774)	Moine des bois
<i>Oxychilus cellarius</i> (Müller, 1774)	Zonite des caves
<i>Oxychilus draparnaudi</i> (Beck, 1837)	Grand zonite
<i>Succinea putris</i> (Linnaeus, 1758)	Ambrette commune
<i>Tandonia budapestensis</i> (Hazay, 1880)	Limace souterraine
<i>Vitrina pellucida</i> (Müller, 1774)	Vitrine transparente

2) Deuxième site "Chaussé de Gramptine" (entrée bois carrière d'Inzefond) :

Nom latin	Nom vernaculaire
<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	Paludine saumâtre
<i>Ancylus fluviatilis</i> Müller, 1774	Ancyle fluviatile
<i>Arion hortensis</i> (Férussac, 1819)	Limace des jardins
<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon 1855	Arion vulgaire [limace]
<i>Clausilia bidentata</i> (Ström, 1765)	Clausilie noirâtre
<i>Discus rotundatus</i> (Müller, 1774)	Hélice bouton
<i>Fruticicola fruticum</i> (Müller, 1774)	Hélice des buissons
<i>Helicodonta obvoluta</i> (Müller, 1774)	Helice planorbe
<i>Oxychilus helveticus</i> (Blum, 1881)	Zonite helvétique
<i>Oxyloma elegans</i> (Risso, 1826)	Ambrette élégante
<i>Pisidium</i> sp.	
<i>Sphaerium corneum</i> (Linnaeus, 1758)	Cyclade cornée



*Fruticicola fruticum* (Müller, 1774)  
- Hélice des buissons



*Succinea putris* (Linnaeus, 1758)  
- Ambrette commune



*Oxytoma elegans* (Risso, 1826)  
- Ambrette élégante



*Deroceras reticulatum* (Müller, 1774)  
- Limace réticulée



*Limax maximus* Linnaeus, 1758  
- Limace léopard



*Fruticicola fruticum* (Müller, 1774)  
- Hélice des buissons



*Monachoides incarnatus* (Müller, 1774) - Moine des bois  
et  
*Macrogastra rolphii* (Turton, 1831) - Clausilie de Rolph



*Cochlicopa lubrica*  
(Müller, 1774)  
- Bulime brillant



*Merdigera obscura* (Müller, 1774)  
Bulime obscur



*Cepaea nemoralis* (Linnaeus, 1758)  
- Escargot des haies ou des bois



*Oxychilus helveticus* (Blum, 1881)  
Zonite helvétique



*Tandonia budapestensis* (Hazay, 1880)  
- Limace souterraine